

# コケそうじシリーズ

日本製 | 非農耕地専用

イシクラゲにも効くのはコケそうじだけ!  
驚異のパワーで駆除します!

パネフリ  
PANEFRI



スプレー付



希釈液タイプ / 500ml

濃縮液タイプ / 500ml

濃縮液タイプ / 2L

濃縮液タイプ / 20kg箱

農薬が効かない..気持ち悪~い...イシクラゲに!



散布前



散布後

ハウスのコケに

グランドシートに



散布前



散布  
30日後



散布前



散布  
20日後

敷地内のコケに

タイル外壁のコケに



散布前



散布  
2週間後



散布前



散布  
2ヶ月後



## 濃縮液タイプ



品名：コケそうじ濃縮液500ml  
 原材料：グレープフルーツ種子抽出物(GSE)  
 内容量：500ml  
 入数：6本  
 メーカー小売希望価格：本体3,500円+消費税  
 JANコード：4571102553481



品名：コケそうじ業務用濃縮液2L  
 原材料：グレープフルーツ種子抽出物(GSE)  
 内容量：2L  
 入数：4本  
 メーカー小売希望価格：本体10,500円+消費税  
 JANコード：4571102553450



品名：コケそうじ業務用濃縮液20kg  
 原材料：グレープフルーツ種子抽出物(GSE)  
 内容量：20kg  
 入数：1箱  
 メーカー小売希望価格：本体95,000円+消費税  
 JANコード：4571102553474

### 使用方法

- 本品1に対して水20を加え、よくかき混ぜて20倍希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。
- ハンドスプレーや噴霧器などを使い、希釈液をコケに向けてコケ全体が濡れる程度にたっぷり散布します。スプレー後は擦ったりせずそのまま放置します。少なくとも半日は雨や水に当たらないようにしてください。
- 数時間から2日後にはコケが枯れ始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。
- 希釈液は希釈したその日のうちに使い切ってください。

### 〈希釈例〉

コケそうじ濃縮液	水
50ml	1ℓ
100ml	2ℓ
500ml	10ℓ

## 希釈液タイプ（スプレー付）



品名：コケそうじスプレー  
 原材料：グレープフルーツ種子抽出物(GSE)  
 内容量：500ml  
 入数：20本  
 メーカー小売希望価格：本体980円+消費税  
 JANコード：4571102553443

### 使用方法

- 消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。
- 数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。
- 数ミリ～数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。



### 注意事項

- ・濡れている場所に散布するとコケそうじが薄まってしまいます。希釈倍率を10倍希釈にするなど濃く調整してください。
  - ・吸水性のある下地に散布する時はたっぷり散布してコケが十分に濡れるようにしてください。散布量が少ないと下地材に吸収されてしまいコケへの効果が弱くなります。
  - ・雨の日は有効成分が流されて効果が発揮されませんのでご使用をお控えください。
  - ・夏場の使用は気温の低い早朝の時間帯に行くことをお勧めします。
  - ・垂直面など液だれするような場所には、数時間～1日程度の間隔をあけて2～3回スプレーを繰り返してください。
  - ・農薬ではありません。家庭菜園も含めて農耕地には使用できません。
  - ・お花や苗などデリケートなものに掛かってしまった場合は、水で洗い流してください。
  - ・保管する場合は直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
  - ・目に入った場合は流水で洗ってください。誤って大量の液が目に入った時やアレルギー体質の方は洗眼後、医師による診察を受けてください。
  - ・敏感肌の方は肌荒れを防ぐため手袋などを着用してください。
  - ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
  - ・白木の木材に使用するとシミが生じる恐れがありますので使用しないでください。
- 〈禁止事項〉魚毒性があります。濃縮液をそのまま河川などに捨てないでください。

対象物	効果の程度	備考
コケ全般(ゼニゴケを除く)	◎	蘚類・苔類
イシクラゲ	◎	藍藻類
地衣類	○	地衣類
ゼニゴケ	△	苔類

代理店



# 農薬が効かない! 気持ち悪〜い!

# イシクラゲを駆除

# コケそうじシリーズ

日本製 非農耕地専用

パネフリ  
PANEFRI

## 驚異のパワーで イシクラゲを駆除!!



STAGE  
1

### 休眠しているイシクラゲを目覚めさせる

乾燥してパリパリになっているイシクラゲはいわば冬眠状態であり、ほとんど生命活動を停止した状態です。このように活性が低いイシクラゲにコケそうじを散布しても効果は限定的なものとなります。乾燥状態のイシクラゲには、まず水を掛けて湿潤状態として活発に活動再開させます。イシクラゲは30分から1時間程度で緑色の湿潤状態に戻ります。

STAGE  
2

### コケそうじを散布する

噴霧器やじょうろを使ってコケそうじを散布。イシクラゲ全体が十分に濡れる量をたっぷり散布します。イシクラゲそのものだけでなく、まわりの土壌も含めて面的に散布することがコツです。散布した後、24時間は雨が降らない日を選んでください。降雨があると効果が出ません。

STAGE  
3

### 繰り返し散布を行う

最初の散布から2〜3日後に、2回目の散布を行います。

STAGE  
4

### 効果の確認を行う

最初の散布から1週間が経過した頃に効果の確認を行います。イシクラゲ全体が緑色をから褐色に変化していればコケそうじが効いています。褐変した部位は光合成能力をすでに失っており、そのまま放置していると自然に風化して土に戻っていきます(※)。緑の部分と褐色の部分が併存している場合は効果にムラが生じています。緑の部分に再散布を行ってください。

※褐色に変化したイシクラゲが自然に消え去るまでには相当な時間が掛かります。

STAGE  
5

### 清掃を行う

④の状態になっていれば、イシクラゲは地面から簡単に剥がれて掃除ができる状態です。早くきれいにしたい場合は、ホウキなどで掃き集めることが可能です。